

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 20-3-74 727100

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, Maison de l'Agriculture - Bât. 5 - Place Chaptal

34076 MONTPELLIER-CEDEX

C.C.P. MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

30 francs
nouvelle série n° 6

ABRICOTIERS

Les précipitations (neige et pluies) parfois très abondantes (Gard) ainsi que les basses températures souvent enregistrées maintiennent ou créent des conditions extrêmement défavorables à la floraison. Il faut donc dès que possible pulvériser une bouillie anticryptogamique pour rétablir l'état sanitaire.

PECHERS

Bien que la floraison des pêchers soit moins avancée que celle des abricotiers, les conditions climatiques actuelles sont également très défavorables au pêcher. Les traitements d'hiver ont été lavés ainsi que les traitements visant à la prévention de la cloque et à l'élimination des pontes de pucerons; une vigilance particulière est à observer concernant ces insectes.

Par ailleurs, et en particulier sur nectarines, les thrips peuvent être à l'origine de déformations très préjudiciables.

Dès que possible l'épandage de bouillies mixtes est indispensable dans la plupart des vergers. Cette intervention se placera alors que les arbres seront totalement ou au moins partiellement fleuris, en conséquence, recourir à un insecticide non toxique pour les abeilles tel que :

Toxaphène, Pyrethrine, Roténone, Endosulfan, Phosalone, Diethion...

POMMIERS

ANTHONOME DU POMMIER

Ce petit coléoptère a très longtemps été le principal parasite printanier des pommiers. Les insecticides chlorés avaient beaucoup contribué à réduire son importance économique. Il semble que depuis deux ans on observe une recrudescence des dégâts de l'anthonome dans les vergers de montagne, tandis que la présence de ce ravageur est observée dans quelques vergers de plaine.

Il convient donc partout où la présence de l'insecte a été reconnu de prévoir un traitement au Lindane lorsque le stade C3 sera atteint.

TAVELURE DU POMMIER

La végétation ayant peu évolué à ce jour, attendre un prochain avis.

POIRIERS

TAVELURE DU POIRIER

La floraison de certains arbres se situe déjà au stade D et même D3; les possibilités de contamination existent donc c'est pourquoi nous conseillons le renouvellement de la protection conseillée le 26 février.

COLZA (Aude et Gard)

Dans l'Ouest du département de l'Aude, le traitement précédemment conseillé contre le charançon des tiges reste valable, la végétation ayant peu évolué.

Dans le département du Gard, le petit nombre de captures actuellement constaté par les postes de piégeage permet de différer (jusqu'à nouvel avis) toute intervention.

L'Inspecteur : P. BERVILLE

Les Ingénieurs : CHRISTIAN - TROUILLON

Tirage du 13 Mars 1974 2 100 exemplaires

P 90

Pesticides homologués ou en autorisation provisoire de vente au 1^{er} Janvier 1974

utilisables contre les ennemis des cultures mentionnés ci-dessous

LISTES ÉTABLIES PAR LE SERVICE CENTRAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

LES PESTICIDES HOMOLOGUES sont suivis de leur dose d'emploi exprimée, sauf indications contraires en grammes de matière active par hectolitre d'eau. En ce qui concerne les poudrages, les doses sont indiquées, en grammes de matière active par hectare, pour les cultures annuelles seulement.

LES PESTICIDES EN AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE sont précédés d'un astérisque.

A. - ARBRES FRUITIERS

1. — RAVAGEURS ANIMAUX

Anthronome du pommier :

lindane : 12 g
méthoxychlore : 100 g

Anthronome du poirier :

lindane : 12 g
méthoxychlore : 100 g

Carpocapse des pommes et des poires :

aziphos éthyl et méthyl : 40 g
carbaryl : 75 g
* dialifor : 75 g
diazinon : 30 g
diéthion : 100 g
diméthoate : 50 g
féthion : 50 g
fenthion : 50 g
* formétanate
formothion : 50 g
malathion : 75 g
méthoxychlore : 125 g
méthidathion : 30 g
parathion éthyl : 25 g
parathion méthyl : 30 g
phosalone : 60 g
phosmet : 50 g
phosphamidon : 40 g
* tétrachlorvinphos

Tordeuse orientale du pêcher :

aziphos éthyl et méthyl : 40 g
carbaryl : 120 g
* dichlorvos
féthion : 50 g
méthidathion : 40 g
mévinphos : 50 g
parathion éthyl et méthyl : 25 g
phosalone : 60 g

Pucerons :

* acéphate
aziphos éthyl et méthyl : 40 g
bromophos : 50 g
carbophénothion : 45 g
* dialifor : 75 g
diazinon : 25 g
diéthion : 100 g
diméthoate : 30 g

* dioxacarbe (puceron vert du pêcher)

endosulfan : 60 g
féthion : 50 g
fenthion : 75 g
formothion : 40 g
isolane : 10 g
lindane : 30 g
malathion : 75 g

* métamidophos

méthidathion : 30 g
méthomyl : 50 g
mévinphos : 50 g

* monocrotophos (puceron vert du pommier)

naled : 100 g
nichlorfos : 50 g
nicotine : 150 g
ométhoate : 60 g
oxydéméton méthyl : 25 g
parathion éthyl : 20 g
parathion méthyl : 30 g
phosalone : 60 g
phosphamidon : 20 g
pirimicarbe : 37,5 g
prothoate : 30 g
* thiométon
vamidothion : 50 g

Acaréens (1) :

esters phosphoriques de contact

aziphos éthyl et méthyl : 40 g
carbophénothion : 45 g
dialifor : 75 g
diazinon : 25 g
diéthion : 100 g
malathion : 75 g
méthidathion : 40 g
parathion éthyl : 25 g
parathion méthyl : 30 g
phenkapton : 30 g
phosalone : 60 g
prothoate : 30 g

esters phosphoriques systémiques

diméthoate : 30 g
formothion : 40 g
ométhoate : 60 g
oxydéméton méthyl : 25 g
vamidothion : 50 g

acaricides spécifiques

sulfones et sulfonates

chlorbenside : 50 g
chlorofénizon : 50 g
féthion : 50 g
tétradifon : 16 g
tétrasil : 40 g

composés halogénés

* bromopropylate
dicofol : 50 g

dérivé du benzène

binapacryl : 50 g

quinoxaline

chinométhionate : 12,5 g
thioquinox : 37,5 g

formamidine

chlorphénamidine : 50 g

divers

* benzomate
chlorfénéthol + chlorfensulfide :
37,5 g + 37,5 g
* chlorphénamidine + formétanate
dioxathion + féthion : 25 g + 50 g
* féthion
* hydroxyde de tricyclohexylétain

Mouche méditerranéenne des fruits :

diéthylidiphényldichloréthane : 175 g
diméthoate : 30 g
fenthion : 50 g
formothion : 37,5 g
malathion : 100 g
méthoxychlore : 250 g
trichlorfon : 100 g

Mouche de la cerise :

diazinon : 30 g
diméthoate : 30 g
fenthion : 50 g
formothion : 50 g
* malathion
oléoparathions : 20 g

Mouche de l'olive :

diazinon : 30 g
diméthoate : 30 g
* fenthion
formothion : 40 g
phosphamidon : 30 g

91

2. — MALADIES

Tavelures :

- bouillies bordelaise et bourguignonne, oxychlorure de cuivre, sulfate basique de cuivre, oxyde cuivreux : 250 g de cuivre métal (dose maximum)
bouillie sulfocalcique : dose homologuée pour chaque spécialité commerciale
- | | |
|---|----------------------------|
| * benomyl | manèbe : 160 g |
| captafol : 100 g | * méthylthiophanate |
| captane : 150 g | oxyquinoléate |
| carbatène : 200 g | de cuivre : 80 g |
| * carbendazim | propinèbe : 200 g |
| dichlone : 50 g | soufres micronisés : 600 g |
| dithianon : 50 g | de soufre (dose max.) |
| doquadine : 70 g | thirame : 200 g |
| folpel : 100 g | zinèbe : 200 g |
| mancozèbe : 160 g | zirame : 180 g |
| association de zinèbe et de cuivre, association de zirame et de cuivre : doses homologuées pour chaque spécialité commerciale | |

Oïdiums :

- * benomyl
binapacryl : 50 g
bouillie sulfocalcique : dose homologuée pour chaque spécialité commerciale
chinométhionate : 7,5 g
dinocap : 25 g
drazoxolon : 40 g
* méthylthiophanate
soufres fluents en poudrage
soufres dispersés : 600 g de soufre pur (dose maximum)
soufres micronisés : 600 g de soufre pur (dose maximum)

Cloque du pêcher :

- bouillies bordelaise et bourguignonne, oxychlorure de cuivre, oxyde cuivreux, sulfate basique de cuivre : 500 g de cuivre métal
captafol : 120 g
captane : 250 g
ferbame : 175 g
thirame : 175 g
zirame : 175 g
association de zirame et de cuivre : dose homologuée pour chaque spécialité commerciale

3. — TRAITEMENT D'HIVER DES ARBRES FRUITIERS

- colorants nitrés : 600 g
dinoterbe : 600 g
huiles anthracéniques : 5 l d'huile réelle
* huile d'anthracène + fluénétol + huile minérale
huiles de pétrole : 2,5 l à 3 l d'huile réelle
huiles jaunes : 1,5 l à 2 l d'huile réelle + 100 à 150 g de DNO
oléomalathion : 1 l d'huile réelle + 300 g de malathion
oléoparathions : 1,25 l d'huile réelle + 45 g de parathion
association d'huiles anthracéniques et de colorants nitrés, association d'huiles anthracéniques et d'huiles de pétrole, association d'huiles anthracéniques, d'huiles de pétrole et de colorants nitrés : doses homologuées pour chaque spécialité commerciale

Remarque : Sur les arbres fruitiers à noyau, les doses d'emploi des huiles anthracéniques et des huiles de pétrole doivent être réduites de moitié

B. — VIGNE

1. — RAVAGEURS ANIMAUX

Tordeuses de la grappe :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| * acéphate | mévinphos : 50 g |
| azinhos éthyl et méthyl : 40 g | parathion éthyl : 20 g |
| bromophos : 50 g | parathion méthyl : 30 g |
| carbaryl : 120 g | parathion éthyl et méthyl : |
| carbaryl : en poudrage | en poudrage |
| dialifor : 75 g | phosalone : 60 g |
| diazinon : 25 g | phosalone : en poudrage |
| diazinon : en poudrage | * tétrachlorvinphos |
| * dichlorvos | |
| fénitrothion : 50 g | |
| malathion : 75 g | |
| malathion : en poudrage | |
| méthomyl : 37,5 g | |
| méthidathion : 30 g | |

Acarions (1) :

esters phosphoriques de contact

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| azinhos éthyl et méthyl : 40 g | parathion méthyl : 30 g |
| carbophénothion : 30 g | phenkapton : 20 g |
| * dialifor | phosalone : 60 g |
| diazinon : 25 g | phosalone : en poudrage |
| diéthion : 75 g | prothoate : 30 g |
| malathion : 75 g | |
| méthidathion : 40 g | |
| parathion éthyl : 25 g | |

esters phosphoriques systémiques

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| diméthoate : 30 g | oxydéméton méthyl : 25 g |
| formothion : 40 g | vamidothion : 50 g |
| * monocrotophos | |

acaricides spécifiques

sulfones et sulfonates

- | | |
|----------------------|-------------------|
| chlorbenside : 50 g | tétradifon : 16 g |
| chlorofénizon : 50 g | * tétrasul |
| fénizon : 50 g | |

composés halogénés

- | | |
|------------------|-----------------------|
| * bromopropylate | dicofof : en poudrage |
| dicofof : 50 g | |

quinoxaline

- thioquinox : 37,5 g

formamidine

- * chlorphénamidine

divers

- * benzomate
dioxathion + fénizon : 25 g + 50 g
* hydroxyde de tricyclohexylétain
chlorfénéthol + chlorfensulfide 37,5 g + 37,5 g

2. — MALADIES

Mildiou :

- bouillies bordelaise et bourguignonne, sulfate basique de cuivre, oxychlorure de cuivre, oxyde cuivreux : 500 g de cuivre métal
captafol : 120 g
captane : 175 g
carbatène : 300 g (raisin de table)
dichlofluamide : 125 g
folpel : 150 g
folpel : en poudrage
* mancopper
mancozèbe : 280 g
manèbe : 280 g
propinèbe : 280 g
zinèbe : 250 g

association de carbatène et de cuivre, * association de dichlofluamide et de cuivre, association de folpel et de cuivre, association de mancozèbe et de cuivre, association de manèbe et de cuivre, association de métiram-zinc et de cuivre, association de propinèbe et de cuivre, association de zinèbe et de cuivre : doses homologuées pour chaque spécialité commerciale
hydroxyde de cuivre, mancozèbe, manèbe, oxychlorure de cuivre, sulfate basique de cuivre en traitements complémentaires du mildiou de la grappe en poudrage

Black-rot :

- bouillies bordelaise et bourguignonne, sulfate basique de cuivre, oxychlorure de cuivre, oxyde cuivreux : 500 g de cuivre métal
captafol : 180 g
captane : 175 g
dichlofluamide : 250 g
folpel : 175 g
mancozèbe : 280 g
manèbe : 280 g
propinèbe : 280 g
zinèbe : 250 g
association de carbatène et de cuivre, * association de dichlofluamide et de cuivre, association de folpel et de cuivre, association de mancozèbe et de cuivre, association de manèbe et de cuivre, association de propinèbe et de cuivre, association de zinèbe et de cuivre : doses homologuées pour chaque spécialité commerciale

Pourriture grise :

- * bénomyl
- * captane
- * carbendazim
- * dichlofluanide
- * folpel (pulvérisation et poudrage)
- * méthylthiophanate
- * thirame

Oïdium :

- * bénomyl
- * dichlofluanide
- dinocap : 30 g
- dinocap : en poudrage
- * méthylthiophanate
- soufres dispersés : 1 000 g de soufre pur
- soufres micronisés : 1 000 g de soufre pur
- soufres mouillables ordinaires (à ajouter à une bouillie bordelaise en raison de l'insuffisance de la tenue en suspension s'ils sont utilisés seuls) : 2 000 g de soufre pur
- soufres : en poudrage

3. — TRAITEMENT D'HIVER DE LA VIGNE

Cochenilles :

- dinoterbe : 600 g
- huiles anthracéniques, huiles jaunes, oléomalathion, oléoparathions : voir les doses homologuées pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers

Excoriose :

- arsénite de soude : 625 g d'arsenic
- colorants nitrés : 600 g
- huiles jaunes : 1,5 l à 2 l d'huile réelle + 100 à 150 g de DNOC

Esca :

- arsénite de soude : 1 250 g d'arsenic

C. - POMME DE TERRE

Doryphore :

- | | |
|---|---------------------|
| azinphos éthyl et méthyl : 40 g | méthidathion : 30 g |
| carbaryl : 75 g | méthiocarbe : 100 g |
| carbaryl : 1 000 g | phosalone : 60 g |
| en poudrage | phosalone : 800 g |
| chlorfenvinphos : 25 g | en poudrage |
| * dioxacarb | phosmet : 50 g |
| endosulfan : 35 g | phosphamidon : 30 g |
| endosulfan : 600 g | promécarbe : 75 g |
| en poudrage | roténone : 10 g |
| lindane : 8 g | roténone : 100 g |
| lindane : 100 g | en poudrage |
| en poudrage | |
| toxaphène et polychlorocamphane : 150 g | |
| toxaphène et polychlorocamphane : 1 500 g en poudrage | |

Mildiou :

- bouillies bordelaise et bourguignonne : 500 g de cuivre métal
- captafol : 160 g
- chlorothalonil : 150 g
- folpel : 150 g
- mancozèbe : 160 g
- manèbe : 160 g
- métirame-zinc : 200 g
- oxychlorure de cuivre : 500 g de cuivre métal
- oxychlorure de cuivre : en poudrage
- oxyde cuivreux : 500 g de cuivre métal
- oxyde cuivreux : en poudrage
- propinèbe : 200 g
- sulfate basique de cuivre : 500 g de cuivre métal
- sulfate basique de cuivre : en poudrage
- zinèbe : 200 g

association de carbatène et de cuivre, * association de folpel et de cuivre, association de manèbe et de cuivre, association de propinèbe et de cuivre, association de zinèbe et de cuivre, association de zirame et de cuivre : doses homologuées pour chaque spécialité commerciale

mancozèbe, manèbe (spécialités à 6 % de matière active minimum) : 1 800 g en traitements complémentaires en poudrage

D. - COLZA

(en grammes de matière active à l'ha)

Petite altise du colza :

- endosulfan : 150 g en pulvérisation
- 200 g en poudrage
- lindane : 120 g en pulvérisation
- 160 g en poudrage
- malathion : 500 g en pulvérisation
- 700 g en poudrage
- méthidathion : 200 g en pulvérisation
- parathions : 130 g en pulvérisation
- 180 g en poudrage
- toxaphène et polychlorocamphane : 1 700 g en pulvérisation
- 2 300 g en poudrage

Grosse altise, méligèthe :

- endosulfan : 250 g en pulvérisation
- 300 g en poudrage
- lindane : 200 g en pulvérisation
- 275 g en poudrage
- malathion : 700 g en pulvérisation
- 900 g en poudrage
- méthidathion : 250 g en pulvérisation
- parathions : 200 g en pulvérisation
- 275 g en poudrage
- phosalone : 1 000 g en pulvérisation
- toxaphène et polychlorocamphane : 2 250 g en pulvérisation
- 3 000 g en poudrage

Charançon des tiges :

- endosulfan : 400 g en pulvérisation
- 500 g en poudrage
- lindane : 300 g en pulvérisation
- 400 g en poudrage
- méthidathion : 300 g en pulvérisation
- parathions : 300 g en pulvérisation
- 400 g en poudrage
- toxaphène et polychlorocamphane : 4 000 g en pulvérisation
- 5 000 g en poudrage

Charançon des siliques :

- endosulfan : 600 g en pulvérisation
- 800 g en poudrage
- lindane : 500 g en pulvérisation
- 600 g en poudrage
- méthidathion : 500 g en pulvérisation
- parathions : 500 g en pulvérisation
- 600 g en poudrage
- phosalone : 1 200 g en pulvérisation
- toxaphène et polychlorocamphane : 4 000 g en pulvérisation
- 5 000 g en poudrage

E. - BETTERAVE

(en grammes de matière active à l'ha)

Pucerons :

- * aldicarbe
(traitement du sol)
- * carbofuran
(traitement du sol)
- * dialifor
diméthoate : 500 g
disulfoton : 1 000 g (granulés dans la raie du semis)
formothion : 500 g
isolane : 200 g
lindane : 300 g
mévinphos : 350 g
oxydéméton méthyl : 200 g

Mouche de la betterave :

- * acéphate
- * aldicarbe
(traitement du sol)
- azinphos éthyl
et méthyl : 250 g
- * carbofuran
(traitement du sol)
- diazinon : 150 g
diméthoate : 250 g
fenthion : 500 g
- * formétanate

- parathion éthyl : 200 g
- parathion méthyl : 300 g
- * phorate
(traitement du sol)
- phosphamidon : 300 g
- vamidothion : 500 g

- formothion : 250 g
- lindane : 300 g
- mévinphos : 350 g
- parathions : 150 g
- * phorate
(traitement du sol)
- phosalone : 500 g
- phosphamidon : 200 g
- * thiométon
- toxaphène : 1 500 g
- trichlorfon : 300 g

F. - MAIS

(en grammes de matière active à l'ha)

Pyrale :

- * bacillus thuringiensis
DDT (granulés) : 1 500 g
- * fénitrothion
- * parathion
- * tétrachlorvinphos

G. - CULTURES LÉGUMIÈRES

Pucerons :

- azinphos éthyl
et méthyl : 40 g
- bromophos : 50 g
- carbophénothion : 45 g
- diazinon : 25 g
- diazinon : 350 g
en poudrage
- dichlorvos : 100 g
- diéthion : 75 g
- diméthoate : 30 g
- endosulfan : 60 g
- fénitrothion : 50 g
- fenthion : 75 g
- formothion : 40 g
- isolane : 6 g
- lindane : 30 g
- lindane : 400 g
en poudrage
- malathion : 75 g

- malathion : 1 000 g
en poudrage
- * méthidathion
- méthomyl : 30 g
- mévinphos : 35 g
- naled : 100 g
- nichlorfos : 50 g
- nicotine : 150 g
- * ométhoate
- parathion éthyl : 20 g
- parathion méthyl : 30 g
- parathions : 250 g
en poudrage
- phosalone : 60 g
- pirimicarbe : 37,5 g
- prothoate : 30 g
- pyréthrines
synergisées : 12 g
- roténone : 20 g

Acaricidants (1) :

esters phosphoriques de contact

- azinphos éthyl
et méthyl : 40 g
- carbophénothion : 45 g
- diazinon : 25 g
- diazinon : 360 g
en poudrage
- diéthion : 100 g

- malathion : 75 g
- méthidathion : 40 g
- naled : 100 g
- parathion éthyl : 25 g
- parathion méthyl : 30 g
- phenkapton : 20 g
- phosalone : 60 g
- prothoate : 30 g

(1) Les acaricides ont été divisés en groupes chimiques, pour permettre aux utilisateurs de varier leur choix, afin d'éviter d'éventuels phénomènes d'accoutumance.

N.B. — Cette note devra être soigneusement conservée, les avis s'y reporteront fréquemment au cours de l'année

esters phosphoriques systémiques

- diméthoate : 30 g
- formothion : 40 g

mévinphos : 35 g

acaricides spécifiques

sulfones et sulfonates

- chlorbenside : 50 g
- chlorofénizon : 50 g
- fénizon : 50 g

- * propargil
- tétradifon : 16 g
- tétrasil : 40 g

composés halogénés

- dicofof : 50 g
- dicofof : 700 g en poudrage

dérivés du benzène

- binapacryl : 50 g

quinoxaline

- chinométhionate : 12,5 g
- thioquinox : 40 g

formamidine

- chlorphénamidine : 50 g

divers

- * benzomate
- dioxathion + fénizon : 25 g + 50 g
- * hydroxyde de tricyclohexylétain

Mouche de l'asperge :

(aspergerales en voie d'établissement)

- diazinon : 30 g
- diméthoate : 50 g

formothion : 50 g

Mouche de l'endive :

- diméthoate : 30 g

formothion : 37,5 g

Mouche de l'oignon :

- carbophénothion (traitement du sol — granulés) : 6 000 g/ha
- chlorfenvinphos (traitement du sol — pulvérisation et granulés) : 5 000 g/ha
- diazinon (traitement du sol — granulés) : 8 000 g/ha
- diéthion (traitement du sol — granulés) : 5 000 g/ha
- diéthion (traitement des semences) : 60 g/kg
- dichlofenthion (traitement du sol — granulés) : 6 000 g/ha
- * fonofos
- trichloronate (traitement du sol — granulés et pulvérisation) : 2 500 g/ha
- trichloronate (traitement des semences) : 40 g/kg

Mouche de la carotte :

- carbophénothion (traitement du sol — granulés) : 6 000 g/ha
- chlorfenvinphos (traitement du sol — pulvérisation et granulés) : 5 000 g/ha
- diazinon (traitement du sol — granulés) : 8 000 g/ha
- diéthion (traitement du sol — granulés) : 5 000 g/ha
- dichlofenthion (traitement du sol) : 6 000 g/ha
- * fonofos (traitement du sol)
- trichloronate (traitement du sol — granulés et pulvérisation) : 2 500 g/ha

Oïdiums :

- * bénomyl
- chinométhionate : 7,5 g
- dinocap : 25 g
- dinocap : en poudrage
- * drazoxolon
- * méthylthiophanate
- * méthirimol
- soufres fluents (poudrage)
- soufre micronisé : 600 g de soufre pur (dose maximum)
- * thiophanate

Imprimerie des Stations d'Avertissements Agricoles - * Nos Paritaires 477 AD, 478 AD et 523 AD à 536 AD.